

113 學年度四技二專第四次聯合模擬考試

衛生與護理類 專業科目(二) 詳解

113-4-10-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	A	B	C	A	C	B	A	D	C	B	A	B	C	A	D	D	C	C	A	B	A	B	A	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	C	B	B	B	C	D	C	D	B	B	C	D	B	B	A	A	C	D	B	D	C	C	D

- (A) 產後須適度運動，以利體力恢復
(B) 不可坐浴，坐浴會影響傷口癒合
(C) 麻油雞含酒精影響傷口癒合
- ④雙足踝水腫，常見於懷孕第三期，不需立即就醫
- ①母乳含有 A 型免疫球蛋白
④分泌催產激素，增加產後子宮收縮
- (A) 產後除了需要足夠休息外，也要適度運動，加速子宮和全身體恢復
(B) 懷孕中期，胎兒聽覺已發育完成
(D) 懷孕初期，易發生噁心、孕吐情形
- ①大多為神經退化型失智(阿茲海默症)
④長期記憶比短期記憶好
⑤為延緩失智症惡化，應儘速就醫
- ②心血管失去彈性，容易產生高血壓
③膀胱容量變小
- ①長照專線 1966
- ①應適度水分攝取
③不宜經常變換家中物品擺設
- (A) 因應聽力減退，說話宜調高音量，不是音調
(B) 不宜大聲糾正錯誤
(C) 擁抱也是身體接觸
- ②交通接送就醫或物理治療，不是買菜
- (A) 作用是抑制或延遲卵巢排卵
(B) 在性行為後 12 小時內可以有最好的避孕效果，第一代服用的時間最遲不能超過 72 小時(3 天)，第二代藥物為 5 天
(C) 常見副作用包括噁心、下腹疼痛、疲倦、頭痛及頭暈嘔吐、經期點狀出血、不規則出血，不適合常規避孕
(D) 避孕效果最高約 90%
- (A) 避孕貼為女性荷爾蒙，會讓月經規則
- (D) 催經針是黃體素，有安胎作用
- ①服用前列腺素引產，用在 12 週以上
③服用 RU486，在 7 週內使用
④月經規則術，在 6 週內使用
- (D) 出現黃綠色、搔癢不可做陰道灌洗，應就醫檢查
- (A) 2030 年將達到 95-95-95 之目標
(B) 紅色絲帶
(D) 目前雞尾酒治療可以抑制病毒，仍無法治癒愛滋病
- (B) 從長乳牙開始，需每半年到牙科醫療機構接受口腔檢查
- (B) 黃斑部病變
(C) 青光眼

- (D) 視網膜剝離
- (A) 中熱衰竭會大量排汗導致水分及鹽分喪失
- ①不可壓住病人四肢，避免骨折
④不可將手帕塞入口中，以免窒息
⑤發作超過 5 分鐘要送醫
- ④不可冰敷
⑤傷口約 21 天癒合
- ⑤不可將塑膠袋罩住口鼻，以避免窒息
- (A) 使用 AED 順序是開貼插電
(B) 電擊後不需移除貼片，繼續進行壓胸動作
(D) 若 AED 指示需要電擊時，不可以接觸病人
- ①檢查呼吸是看病人胸腹部上下起伏
②在 10 秒內完成檢查呼吸
③應先檢查呼吸後再實施胸部按壓
- (A) 8 歲以下應先急救再求救
(C) 1 歲以上應實施哈姆立克推腹法，排除異物
- ①最多為 2 期，6 個月
③吸毒者自動向衛生福利部所屬醫療機構請求治療者，若再次吸毒不需交付司法機關審理，但以 1 次為限
- 應先前往消保單位或撥打消費者保護專線，警察局報案是準備訴訟時才要進行。消費爭議程序為申訴→調解→訴訟
- ①是商家賣東西噱頭
②尋找網路瘦身產品，越快瘦不是越好，可能添加有害物質
- ②數字越小越好
- ③  為環保標章
- (C) 定期每半年至一年視力檢查一次
- ③Speech：說話表達能力
④Time：3 小時內送醫
- (B) 加強入境旅客發燒篩檢是屬於邊境管制
- ④酒精無效，應使用漂白水(氯水)消毒
- (A) 憂鬱症
(B) 心情憂鬱
(D) 心情憂鬱與反人格異常無關
- (A) 檢測 O₃、PM_{2.5}、PM₁₀、CO、SO₂、NO₂ 等 6 個測項
(B) 301~500 是褐紅色，對健康危害，健康威脅達到緊急，所有人都可能受到影響
(C) 0~50 是綠色，代表空氣品質良好

46. ①經帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬感染
48. ①乳房 X 光攝影
③每 2 年 1 次
⑥每 2 年 1 次
50. (A) 父親為肥胖
(B) 母親為正常
(C) 女兒為正常