

113 學年度四技二專第四次聯合模擬考試

家政群幼保類 專業科目(二) 詳解

113-4-12-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	B	D	C	A	A	B	A	C	D	B	C	A	D	B	B	D	C	A	B	B	D	D	A	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	A	D	B	D	A	C	C	B	A	C	B	D	B	D	A	C	B	D	A	C	D	A	C

- (A) 嬰兒期
(B) 幼兒期
(D) 青年期(後期)
- (A) 也包含心理的變化，如大腦發展、情緒的成熟以及神經系統的逐步完善等
(C) 「發展」不僅包括量的變化，還涵蓋質的轉變，涉及心理和生理兩方面的進展
(D) 生長可透過科學儀器測量變化，發展不容易測量出改變
- (A) 指大小的改變
(B) 指比例的改變
(C) 與生存無關的反射動作才會消失
- (A) 指生殖系統
(B) 指神經系統
(D) 生殖系統嬰幼兒期幾乎沒有生長，青春期的急遽發展
- (B) 「雙胞胎爬樓梯實驗」的觀點說明成熟的重要性，「早期剝奪實驗」說明環境的重要性
(C) 說明環境的重要性
(D) 說明學習的重要性
- (B) 受精作用發生在輸卵管外側 $\frac{1}{3}$ 處
(C) 約 7 天左右
(D) 約 14 天左右
- (A) 第 21 對染色體多一條為唐氏症
(C) 唐氏症臉部特徵為五官扁平、眼距寬、鼻樑較塌
(D) 透納氏症患者為第 23 對性染色體只有一個 X，所造成
- (B) 羊水的功能是保護胎兒並維持恆溫
(C) 臍帶的功能是傳遞營養和氧氣
(D) 胎盤的功能為儲存營養外，還幫助胎兒排除代謝廢物並進行氣體交換
- (A) 絨毛膜取樣術通常在懷孕 10 至 12 週進行，可用於檢測染色體問題
(B) 臍帶血採樣術可以診斷染色體異常的疾病，包含唐氏症、透納氏症、海洋性貧血、血友病、神經管缺損等疾病
(D) 超音波檢查主要用來檢查胎兒的身體結構問題，而非染色體異常
- (A) 鈣質對骨骼發展重要
(B) 缺乏葉酸會造成神經管缺陷
(C) 攝取過多的維生素 A 可能會對胎兒造成先天性心臟病、中樞神經系統先天異常
- (A) 整個懷孕期間使用藥物都可能對胎兒有影響
(C) 懷孕期間吸食毒品均有可能對胎兒的發育和健康造成不良影響
(D) 服用雌激素(DES)的孕婦，其後代可能無法生育
- (C) 液體為羊水，從陰道流出，破水為分娩開始的產兆
- (A) 破水後，擔心細菌進入子宮或臍帶順著羊水滑落，應減少走動，儘快到醫院
- 剛出生的新生兒哭聲是種刺激，也代表著開始用肺呼吸，新生兒胃容量小，還有來自從母體的養分，不至於馬上肚子餓
- (A) $\frac{1}{4}$
(C) 後腦杓的突點，到新生兒的眉間
(D) 新生兒的頭圍會大於胸圍
- (A) 新生兒皮下脂肪比成人少，體溫易受外界溫度影響，應注意保暖
(C) 新生兒採腹式呼吸
(D) 新生兒形成膨風是因為腸壁的神經尚未發育成熟；賁門尚未發育完全，是會造成溢奶與吐奶
- (A) 指清醒活動期
(B) 指熟睡期
(C) 哭鬧期通常會張眼
- (A) 要用 95% 的酒精保持乾燥
(B) 順序為：臍帶根部→臍帶→周圍皮膚
(D) 黃疸輕微者，才是採用照光治療；嚴重者，須採換血治療
- (B) 指配方奶
(C) 指母乳
(D) 指母乳
- (A) 第一年身高增加 20~25 公分，第二年增加 10 公分，第二年後每年增加 4~5 公分
(C) 6 個月時體重是出生時的 2 倍，1 歲時是出生的 3 倍
(D) 增加的體重(約 6~7 公斤)，是出生時的 2 倍，但 1 歲的體重是出生的 3 倍
- 根據卡普指數公式：

$$\text{Kaup 指數} = \frac{\text{體重(g)}}{\text{身高(cm)} \times \text{身高(cm)}} \times 10$$

$$\text{小龍的 Kaup 指數} = \frac{16000(\text{g})}{100(\text{cm}) \times 100(\text{cm})} \times 10 = 16$$
 卡普指數：15~18 為體重普通
- (A) 軸突負責傳遞訊息
(B) 指烏龜抬頭遊戲
(C) 嬰兒搖晃症候群會導致腦部損傷，甚至死亡

23. (A) 掩面遊戲是物體恆存的表現，6 個月之後開始發展
(B) 四個月錐狀細胞發展完成，對彩色物品感興趣
(C) 棉質衣物較能吸汗
24. (B) 表面有顆粒的觸覺球才能刺激皮膚
(C) 視覺追蹤能力約 6 個月後才算穩定，宜放慢速度
(D) 儘量選用固定而熟悉的味道，能增加安全感
25. (A) 琺瑯質主要由礦物質鈣和磷組成，一旦受損後無法自行再生，不具感知疼痛的功能
(B) 象牙質並不會隨著年齡增厚，對外界刺激有反應
(D) 牙骨質覆蓋在牙齒的根部，主要功能是保護牙根並穩定牙齒
26. (A) 如廁訓練宜循序漸進
(C)(D) 不用刻意製造排尿的頻率
27. (A) 醣類攝取過多，會轉為脂肪，造成肥胖；蛋白質攝取過多會增加腎臟和肝臟的負擔
(B) 動物性蛋白質宜占總蛋白質量的 $\frac{2}{3}$
(D) 1~3 歲每天 1,150~1,500 cc
28. (B) 吸吮一側後乳房後，再吸吮另一側即可，頻繁更換恐會影響餵食品質
(C) 使用 70°C 的水沖泡，常溫存放不能超過 2 小時，冷藏不超過 24 小時
(D) 宜在哺餵配方奶的最佳時機為沐浴後或換尿布後
29. 奶量計算：嬰兒體重 kg × (120~150 cc)
小寶奶量：7 × (120~150) = 840~1050 cc
30. (A) 避免過敏，一次添加一種
(C) 添加原則：液狀→糊狀→泥狀、碎丁→條狀→塊狀
(D) 須留意對食物的接受程度和消化功能是否正常
31. (A) 量杯是用來測量食物的容量，不適合用來磨碎馬鈴薯
(B) 濾網可以用來過濾食物，但不適合用來壓碎食材
(C) 食物應該先分裝到製冰盒或保鮮盒中進行保存，不能直接進入冰箱
32. 蜂蜜製作過程中不能殺菌，以免破壞其營養成分，其中還有肉毒桿菌孢子，導致 1 歲以下肉毒桿菌中毒
33. (C) 日本腦炎疫苗是目前預防日本腦炎的最有效手段，接種疫苗可以讓嬰幼兒免受日本腦炎病毒的感染，這是防止該病的重要策略
34. (A) 用餐時應固定地點和時間，並避免進食中斷和過度玩耍，這樣才能培養穩定的飲食習慣
(B) 應逐漸學會自己入睡，而不是一直依賴外界幫助
(D) 應在固定的、安全的環境中睡覺，這樣有助於穩定作息和睡眠習慣的建立
35. (A) 每天都要確實清潔口腔
(C) 亂點立體圖是用來測試兒童的立體感，對預防近視沒有直接的幫助
(D) 光線應充足，且與書本距離為 35 公分
36. (B) 須予以束縛或定位
(C) 應優先考量幼童的年齡與體型，且座椅有限期限為五年
(D) 汽座有固定的安裝方式，須請展售人員示範或協助安裝，並請幼童試乘
37. (A) 倒立拍打背部可能會導致異物卡得更緊
(B) 用手指挖出異物可能會將異物推得更深，導致窒息情況加劇
(D) 可能會延誤搶救時間
38. (A) 用力拍打背部不是 CPR 的一部分
(C) 每分鐘速率為 100~120 次/分
(D) 頭頸部只能輕度伸展
39. (A) 不能撒消毒藥粉可能會導致藥物殘留在傷口中，影響癒合
(B) 要用生理食鹽水沖洗，並消毒
(C) 棉枝由中央往外環清洗傷口，避免感染
40. (B) 象徵期又稱為命名塗鴉期，指 2~3 歲的幼兒，此期繪畫發展特徵為線條圖形的組合，但仍無法畫出具體的形象，會將所畫圖案符號命名
41. (D) 自我中心的特徵為：以為自己的想法就是別人的想法，無法從他人的觀點去思考問題
42. (A) 古典制約為刺激反應的連結，聽到奶瓶搖晃的水聲，就會表現出愉悅的表情，符合古典制約的學習理論
43. (C) 聯合遊戲是指幼兒之間有簡單的互動和分享，彼此交流，但並沒有明確的角色安排、分工、組織或共同的目標
44. 大雄當母親離開時會感到不安，但母親回來後能迅速恢復平靜，屬安全型依戀；小夫對母親的離開和回來反應冷淡，屬迴避型依戀；胖虎對母親回來時他既想接近又顯得生氣和抗拒，是反抗型依戀
45. 樂樂作息規律，指規律性高；茉莉對於刺激敏感較退縮，屬於避性；憂憂面對新環境適應時間長，指適應性低；阿焦對於刺激反應激烈，指反應強度強
46. (A) 巧巧因為恐懼被懲罰，才沒有說實話，屬於「避罰服從取向」
47. 根據張世宗博士的分析，創造力不可能無中生有，它必須建立在知識的累積之上，並運用智力來整合和運用這些知識，才能產生創新的想法
48. 從小朋友讚美的口中得知，妙妙的繪畫內容並非寫實，而是畫其所想到的，如：長頸鹿穿裙子、動物園有巫婆等。屬於繪畫發展中的圖式期
49. (A) 空間智能指對視覺環境的體認能力，包括色彩、線條、形狀和空間的敏感性，因此，繪畫就屬空間智能
50. (C) 糖糖把自己得不到，而別人卻擁有的東西，說成不好因為看不到，而回答：「沒什麼好看。」屬於合理化中的酸葡萄