

110 學年度四技二專第二次聯合模擬考試

衛生與護理類 專業科目(二) 詳解

110-2-10-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	C	D	A	C	D	D	B	A	A	B	D	C	D	B	A	B	A	B	A	C	B	A	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	C	D	C	A	B	B	A	C	C	A	D	D	D	A	D	B	C	D	A	B	C	D	D

1. (A) 很少部分是遺傳
(C) 不可塞東西到病人口中，不可強壓住抽搖的肢體
(D) 需按時服藥，定期追蹤
2. 國健署公布資料，研究指出，42%到 63%的肥胖兒童，長大後會成為肥胖成人，肥胖青少年變成肥胖成人的機率更高達 70~80%
3. 懷孕第 3 週，受精卵在子宮內著床
4. (A) 老年人牙齒健康，可幫助咀嚼、消化
(B)(C) 外出結交朋友，一起做氣功，運動走路，既可使心情愉悅，又可促進骨骼肌肉強健
5. 可參考拒毒八招，反說服法：是以一些資料說服對方，以此拒絕對方的邀約
6. (C) 乳房電腦斷層非每年建議檢查項目
「國民健康局免費乳房攝影：45~70 歲、40~44 歲二等親曾有乳癌家族史之婦女，以上條件每兩年可接受一次免費乳房攝影」
7. (D) 手機平板螢幕平俯視 10~15 度
8. 保險套與輸精管結紮的原理皆是使精卵無法結合
9. 四種情況：溺水、創傷、藥物中毒、小於 8 歲的兒童，先做 CPR 五個循環(約二分鐘)再打電話求援
10. 世界衛生組織對嬰兒營養及餵食的建議：完全哺餵母乳到嬰兒 6 個月大，添加適當的副食品後，持續哺乳到兩歲或是兩歲以上
11. 增加服務對象：50 歲以上失智症者，55 歲以上失能平地原民，49 歲以下失能身心障礙者，65 歲以上衰弱者
12. B 級(長照專賣店)：於固定區域內提供在地化照顧服務，目前已在社區提供相關長照服務之單位，除提供既有服務外，且須擴充功能提供如日間照顧、小規模多機能、團體家屋、社區復健或共餐服務等其中一項之社區式長照服務
13. (D) 因為偉哲爺爺去年中風，中風是腦梗塞或腦出血，都可歸類為腦血管的因素
14. (C) 並非所有老人的計算能力都會退化，即使衰退，也仍可外出採買，與社會接觸
15. 所有選項都可提供滿足爺爺奶奶的需求
16. 空汙、噪音、重金屬、塑化劑等等都是環境對健康的殺手
17. (A) 蔬菜類 3~5 份
18. 健康責任是指個體能自動自發追求，檢測自己的健康狀態
19. 「安寧緩和醫療條例」適用對象是末期病人。「病人自主權利法」適用對象是五大臨床條件：(1) 末期病人。
(2) 處於不可逆轉的昏迷狀態。(3) 永久植物人。(4) 極重度失智。(5) 病人疾病狀況痛苦難以忍受、疾病無法治癒，且依當時醫療水準無其他合適解決方法者。過去安寧條例的意願書之精神是「拒絕」維生醫療、心肺復甦術，其理念是僅倡導「拒絕」過度醫療，保障病人可以得到善終的概念。現在病主法則是站在安寧緩和條例的巨人肩膀上，希望有更進一步的發展，強調的核心精神是「自主選擇」，也就是說，今天如果您在 5 款臨床條件時，無論您是在預立醫療決定書內勾選「願意接受」維持生命治療或人工營養及流體餵養，還是「由醫療委任代理人替您決定」，都是出自於您在知情，與自主思考後，所做出的自主選擇
(B) 原本僅是居家安寧的患者需要長照 2.0 的相關需求，居家醫療和照管中心都能互相連結，例如發現個案不能出門就醫，就可以轉給居家醫師
(C) 「五全照顧」之特色，也就是全人、全家、全程、全隊、全社區照顧
20. 排卵後就在輸卵管壺腹部等待受精。卵子的存活時間約為 24 小時，性交後精液積存在陰道內，精液內有大量的精子，精子的存活時間約為 72 小時
21. 熱衰竭的病患應給予腳高頭低的姿勢，幫助血液回流
22. 不論成人、兒童、嬰兒，速率皆為 100~120 次/分
23. (A) 不論 1 人或 2 人按壓與吹氣的比率 30：2，五循環後換手
(C) 每口氣 1 秒鐘
(D) 壓胸深度勿超過 6 公分
24. (A) 勿任意塗上外用藥物或民間偏方，並無助於傷口的復原，且易引起傷口感染及影響醫護人員的判斷和處理
25. (B) 夾板長度要超過患處前後兩關節
26. 緊急事故處理步驟：
(1) 確定現場安全
(2) 評估傷勢、求救
(3) 決定傷勢嚴重優先順序
(4) 提供救護，直到救援到來
27. (A) 因是八個月孕婦，應用胸壓哈姆立克法
28. (A)(B)(D) 皆是懷孕中期的徵候與照護
29. 「引產」適用於 12 週以上的情況
30. 重點在提升自尊、心理健康、性的自主能力、復原力、防範性危害…等內容，並教導生活技能；是教導做決定的能力而不是防堵
31. 穩定服藥的 HIV 帶原者其實是沒有傳染力的(當然，還是建議安全性行為)；真正加劇愛滋傳播的，恐怕

- 是許多還沒有篩檢、瞭解自己病況的人，HIV 條例卻無法防治後者。所以(A)是不一定
32. (A) 刷牙時常牙齦流血是牙周病的前兆
(C) 漱口不能代替刷牙
(D) 清潔牙縫的工具最好是牙線與牙間刷配合
 33. 國健署表示：預防近視、防止近視惡化無需花大錢，只要到戶外活動，接觸陽光日照就是預防近視發生、延緩度數加深的最好方法！這個保護作用可能來自於陽光會(一) 增加視網膜多巴胺分泌的量，進而抑制眼軸伸長；(二) 戶外遠距離視野，會減少眼睛肌肉緊張，延緩眼球增長
 34. (B) 男性女性皆有可能是性騷擾的受害者
(C) 被性騷擾絕對不是你的錯
(D) 任何人都有可能成為加害者，故要隨時提高警覺
 35. (C) 拉 K 導致個人膀胱不可逆的纖維化
 37. (A) 運動時間可「累積」達成；分 3 次快走 10 分鐘與一次快走 30 分鐘效益相同
 38. (D) 正常空腹血糖值：70~100 mg/dL
 39. (A) 過度日曬、灰塵是造成青春痘的原因之一
(B) 洗臉建議早晚各一次，洗越多油脂分泌越多
(C) 青春痘嚴重可看皮膚科，避免影響自信
 40. 所有的中藥產品都有可能產生副作用，所以服用時一定要遵從中醫師指示
 41. 患者必須服用醫生處方的所有藥物，才能有效根治非淋病性尿道炎。此外，已受感染的性伴侶亦應同時接受治療，否則，你可能會再次受到感染
 43. 腹部輕鬆感會出現在倒數兩周之前，也可給準媽媽心理準備
 44. (A) 只要產婦可以，鼓勵盡早下床活動
(B) 越早開始哺餵越好，不論奶水多寡
(D) 是爲了觀察惡露及避免感染，要確實做好會陰沖洗直到傷口癒合
 45. 植物性食品不含有維生素 B12，孕婦若缺乏，可能會導致胎兒神經管缺陷
 46. 根據 WHO 定義，「活躍老化」是指「持續健康地參與社會、經濟、文化、靈性與市民事務，不只是有身體活動能力或有勞動力」
 47. (A) 是中後期
(C) 建議一起採買，增加了解溝通機會，而且孕婦也要運動
(D) 準爸爸可協助乳房按摩
 48. 過度換氣症候群是因爲急性焦慮所引起的生理、心理反應。發作的時候患者會不自主地加快呼吸，導致過多的二氧化碳被排出而造成低二氧化碳血症，因而也會引發呼吸性鹼中毒
 49. 在職場上不幸發生職業災害或罹患職業病，在勞動部勞工保險局可以獲得幫助
 50. 無論職災勞工有無參加勞保，都可依職業災害勞工保護法申請相關補助，包含職業疾病生活津貼、失能生活津貼、職業訓練生活津貼、看護補助、家屬補助及器具補助