

# 111 學年度四技二專第二次聯合模擬考試

## 衛生與護理類 專業科目(二) 詳解

111-2-10-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	D	D	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C	D	A	D	B	B	A	C	B	D	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	D	A	D	B	C	C	D	D	A	A	B	A	B	B	C	A	D	C	C	A	D	B	D

2. (A) 懷孕晚期下肢容易有浮腫情形  
(B) 懷孕初期容易孕吐，儘量少多餐  
(D) 懷孕中期媽媽可明顯感受胎動
4. (A) 產後應儘早下床  
(B) 產後視個人需要洗髮，洗後迅速吹乾即可  
(C) 產後不能盆浴，避免傷口感染
5. (D) 家居可不穿內衣，外出可穿無束縛內衣
6. (A) 若奶脹不適時，可以冷敷乳房，以減輕乳房腫脹  
(B) 產後母乳分泌，需藉由寶寶吸吮來刺激，母乳才能順暢分泌  
(D) 寶寶吸吮越多，母乳分泌越多
7. (B) 母乳中的鐵比牛奶多，寶寶較不易有貧血問題
8. (A) 曉惠公司應設置哺(集)乳室。依《性別工作平等法》第 23 條第 1 項之規定，僱用受僱者一百人以上之雇主，應提供哺(集)乳室
13. 依據 2016 年 WHO 在〈全球老化與健康報告〉指出，健康老化不只要免於病痛，還要維持身體功能，不失能，不失智，心靈要健康，擁有活躍社交生活，對社會要有所貢獻
14. 標示「碳足跡」數字及計量單位。為產品生命週期所消耗物質及能源，換算為二氧化碳排放當量。要選數字越低越好
15. (B) 肉類生產需要的水是穀類的十倍  
(D) 省水標章是本國經濟部水利署推動
17. (A) 塑膠袋燃燒後會產生戴奧辛、鹽酸等有毒物質，造成男性雌性化等危害
20.  $67 \div (1.62 \times 1.62) = 25.5$
21.  $67 \times 5.5 \times 1(\text{小時}) = 368.5$  大卡  
 $368.5 \times 7(\text{天}) = 2579.5$  大卡  
 $2579.5 \div 7700$  (減一公斤需消耗的熱量) = 0.3 公斤
22. (C) 容易造成黃斑部位病變
25. (A) 口服避孕藥物的避孕原理是抑制排卵  
(B) 男性結紮是防止精子與卵子相遇  
(D) 避孕貼避孕原理是抑制排卵
26. (B) 口服避孕藥須提前幾天吃才能達到避孕效果  
(C) 口服避孕藥有 21 顆或 28 顆，不同廠牌有不同規格  
(D) 口服避孕藥是含雌激素與黃體素
29. (B) 白帶含乳酸，以維持陰道酸性，可抵抗細菌侵犯
33. (C) 16~17 歲男生，BMI 超過 25.6 就是肥胖
34. (A) 每天早晚一杯奶  
(B) 每餐水果拳頭大  
(C) 菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多
35. 第三級：警告(Warning)，避免所有非必要旅遊，避免至當地所有非必要旅遊
- 依據行政院消費者保護處編印的消費者手冊消費者義務：(1) 認知：產品之品質、價格與服務，有提高警覺與提出質疑之義務。(2) 行動：消費者為維護自己權益，必要時有採取或支持各種行動之義務。(3) 關懷：消費者對自己之消費行為，有確保不會對別人造成傷害之義務。(4) 環保：消費者就日常之消費品與消費行為，有了解是否對環境造成污染之義務。(5) 團結：團結就是力量，全體消費者有團結並發揮影響力之義務
38. (B) 在地食材不代表就是安全，還是要觀察食材生長的環境才算數
39. 衛生福利部國民健康署，提出影響健康的四大要素，生活型態 46%、遺傳生物因素 25%、環境因素 19%、醫療保健體系 10%
41. (A) 追蹤國人十大死因演變過程，1952 年時，以傳染病為主  
(B) 依據衛生福利部統計處 110 年十大死因依序為：  
(1) 惡性腫瘤(癌症)。(2) 心臟疾病。(3) 肺炎。(4) 腦血管疾病。(5) 糖尿病。(6) 高血壓性疾病。(7) 事故傷害。(8) 慢性下呼吸道疾病。(9) 腎炎腎病症候群及腎病變。(10) 慢性肝病及肝硬化  
(C) 110 年 COVID-19 死因排名為第 19 名  
(D) 十大癌症死亡率依序為：(1) 氣管、支氣管和肺癌。(2) 肝和肝內膽管癌。(3) 結腸、直腸和肛門癌。(4) 女性乳癌。(5) 前列腺(攝護腺)癌。(6) 口腔癌。(7) 胰臟癌。(8) 胃癌。(9) 食道癌。(10) 卵巢癌  
(<https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5069-70304-113.html>)
42. (C) 常是不可逆的病理變化
43. (B) 血壓 120/80 mmHg 是正常值  
(C) 每次測量血壓靜坐 10~15 分鐘  
(D) 測量血壓時，壓脈帶不低於心臟
44. (A) 男性：腰圍  $\geq 90$  公分(35 吋)是危險因子  
(B) 空腹血漿葡萄糖  $\geq 100$  mg/dl 是危險因子  
(C) 三酸甘油酯  $\geq 150$  mg/dl 是危險因子  
(D) 高密度脂蛋白膽固醇，男性  $< 40$  mg/dl 才算危險因子
45. (A) 乳房 X 光攝影檢查、糞便潛血檢查、子宮頸抹片檢查、口腔癌篩檢
46. (C) 疫苗接種後，一般約 2 週後開始產生保護力(衛生福利部疾病管制署 [https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/yaqfRDwXRIOEAz\\_FJqF6Gg#](https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/yaqfRDwXRIOEAz_FJqF6Gg#))
47. (B) 肺結核藉由空氣或飛沫傳染

- (C) C 型肝炎是藉由接觸傳染、新冠肺炎由空氣或飛沫傳染
- (D) B 型肝炎主要由體液、血液，經過親密接觸或輸血、注射…等途徑而傳染
48. (A) 肺結核若是非開放性肺結核，表示不具傳染性
- (B) 肺結核是由結核桿菌感染
- (C) 卡介苗接種可以預防肺結核
49. (A) 一般感冒約 200 多種，常見的有：鼻病毒、副流感病毒、呼吸道細胞融合性病毒、腺病毒等
- (C) 流感多於冬季流行，一般感冒多於春、秋、冬季流行
- (D) 目前只有流感能接種疫苗
50. (A) 全球登革熱的好發地區，主要集中在熱帶、亞熱帶國家
- (B) 可分為 I、II、III、IV 四種血清型別
- (C) 患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫